



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
**Agroscope**

[DATaphyto.acw-online.ch](https://dataphyto.acw-online.ch)

## Pflanzenschutzmittel für diverse Kreuzblütler (Cima di rapa, (Brunnen)-Kresse, Asia-Salate)

gedruckt am: 27.07.2023

Beachten Sie, dass die nachfolgenden Produkte nur für die jeweils im Feld "gilt für" aufgeführten Kulturen bewilligt sind. Gewisse Anwendungen sind ausschliesslich für bestimmte Anbauformen (Gewächshaus, Freiland, etc.) erlaubt.

Die Dataphyto - Datenbank stellt die aktuelle Bewilligungssituation für Pflanzenschutzmittel im Gemüsebau dar. Bewilligungsänderungen aus den letzten 4 Wochen sind möglicherweise noch nicht erfasst.

Rechtlich verbindlich für einen korrekten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind ausschliesslich die Originaldokumente der Zulassung (verfügbar bei den Firmen und beim BLW)!

### - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Acetamiprid (IRAC Code 4A)

**Barritus Rex (Renovita Wilen GmbH)**



1 w

0.25 kg/ha



**Gazelle SG (Stähler)**

1 w

0.25 kg/ha



**Oryx Pro (Syngenta)**

1 w

0.25 kg/ha



**Pistol (Omya)**

1 w

0.25 kg/ha



Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae)**

Schaderreger:

**Blattläuse**

Hinweise:

Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Vor einem Einsatz muss die Pflanzenverträglichkeit auf einer kleinen Fläche abgeklärt werden. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Wirkstoff: Bacillus thuringiensis var. aizawai (IRAC Code 11A)

**XenTari WG (Leu + Gygax)**



3 d

1 kg/ha



Bewilligt für: **Brunnenkresse**

Schaderreger:

**Eulenraupen (blattfressend)**

Hinweise:

Anwendung: Im Freiland. Nur gegen junge Larvenstadien. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

**XenTari WG (Leu + Gygax)**

3 d

1 kg/ha



Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae), Kresse**

Schaderreger:

**Eulenraupen (blattfressend)**

Hinweise:

Anwendung: Nur gegen junge Larvenstadien. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

**Agree WP (Andermatt Biocontrol)**

3 d

1-2 kg/ha



Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae)**

Schaderreger:

**Blattfressende Raupen (alle)**

**Eulenraupen (blattfressend)**

Hinweise:

Nur gegen junge Larvenstadien. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Maximal 4 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

**Agree WP (Andermatt Biocontrol)**

1 w

1-2 kg/ha



Bewilligt für: **Cima di rapa**

Schaderreger:

**Blattfressende Raupen (alle)**

**Eulenraupen (blattfressend)**

Hinweise:

Nur gegen junge Larvenstadien. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Maximal 4 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7 Tagen. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Wirkstoff: Bacillus thuringiensis var. israeliensis (IRAC Code 11A)

**Solbac (Andermatt Biocontrol)**



s. Info

0.25%



Bewilligt für: **alle Kulturen**





Schaderreger:





**Trauermücken**

Hinweise:


Jungpflanzen. Aufwandmenge: 5 ml/m<sup>2</sup>. Nur gegen Larvenstadien. 2-3 Behandlungen im Abstand von 5-7 Tagen. Boden nach der Anwendung einige Tage feucht halten.

## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Bacillus thuringiensis var. kurstaki (IRAC Code 11A)					
<u>Bewilligt für:</u> Asia-Salate (Brassicaceae), Cima di rapa	<b>Dipel DF (Omya)</b>	3 d	0.6 kg/ha		
<u>Schaderreger:</u>	<u>Hinweise:</u>				
<b>Blattfressende Raupen (alle)</b>	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.				
<b>Eulenraupen (blattfressend)</b>					

Wirkstoff: Cypermethrin (Achtung ÖLN) (IRAC Code 3A)					
	<b>Cypermethrin S (Schneider)</b>	2 w	0.25 l/ha		
	<b>Cypermethrine Médol (Médol)</b>	2 w	0.25 l/ha		

<u>Bewilligt für:</u> Asia-Salate (Brassicaceae), Brunnenkresse, Cima di rapa, Kresse	<u>Hinweise:</u>
<u>Schaderreger:</u>	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 100 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung muss eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m eingehalten werden. Reduktion dieser Distanz beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Anwenderschutz-Auflagen beachten!
<b>Erdflöhe</b>	
<b>Erdräupen</b>	

	<b>Cypermethrin (Sintagro)</b>	2 w	0.25 l/ha	
<u>Bewilligt für:</u> Asia-Salate (Brassicaceae), Cima di rapa, Kresse	<u>Hinweise:</u>			
<u>Schaderreger:</u>	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 100 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung muss eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m eingehalten werden. Reduktion dieser Distanz beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Anwenderschutz-Auflagen beachten!			
<b>Erdflöhe</b>				
<b>Erdräupen</b>				

## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Deltamethrin (Achtung ÖLN) (IRAC Code 3A)



<b>Aligator (Omya)</b>	2 w	0.05 %	
<b>Deltaphar (Schneiter)</b>	2 w	0.05 %	
<b>Deltaphar (United Phosphorus)</b>	2 w	0.05 %	
<b>Deltastar (Stähler)</b>	2 w	0.05 %	

Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae), Cima di rapa, Kresse**

Schaderreger:

**Erdräupen**

Hinweise:

Aufwandmenge: 0.5 l/ha. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 100 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung muss eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m eingehalten werden. Reduktion dieser Distanz beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Bienengefährlich: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigttau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind.

**Decis Protech (Bayer)**      2 w      0.08 %



Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae), Cima di rapa, Kresse**

Schaderreger:

**Erdräupen**

Hinweise:

Aufwandmenge: 0.8 l/ha. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 100 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung muss eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m eingehalten werden. Reduktion dieser Distanz beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Bienengefährlich: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigttau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Fettsäuren (IRAC Code UNE)



**Oleate 20 (Stähler)**

1 w

3 %



Bewilligt für: **alle Kulturen**

Schaderreger:

**Blattläuse  
Spinnmilben**

Hinweise:

Anwenderschutz-Auflagen beachten!

**BIOHOP DeIMON (Renovita Wilen GmbH)**

1 w

2%



**Lotiq (Syngenta)**

1 w

2%



**Natural (Andermatt Biocontrol)**

1 w

2%



Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae), Cima di rapa**

Schaderreger:

**Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)**

Hinweise:

Aufwandmenge: 20 l/ha. Anwendung im Gewächshaus bei Befallsbeginn oder bei Sichtbarwerden der ersten Symptome. Pflanze allseitig gut benetzen. Wirkt nur bei direktem Kontakt. Behandlung nach Bedarf wiederholen. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. Maximal 5 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

**BIOHOP DeIMON (Renovita Wilen GmbH)**

0 d

2%



**Lotiq (Syngenta)**

0 d

2%



**Natural (Andermatt Biocontrol)**

0 d

2%



Bewilligt für: **alle Kulturen**

Schaderreger:

**Blattläuse  
Spinnmilben**

Hinweise:

Pflanze allseitig gut benetzen. Wirkt nur bei direktem Kontakt. Behandlung nach Bedarf wiederholen. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

**Siva 50 (Omya)**

s. Info

2%



**Vesol Pro (Syngenta)**

s. Info

2%



**Vista (Leu + Gygax)**

s. Info

2%



Bewilligt für: **alle Kulturen**

Schaderreger:

**Blattläuse  
Spinnmilben**

Hinweise:

Pflanze allseitig gut benetzen. Wirkt nur bei direktem Kontakt. Behandlung nach Bedarf wiederholen. Vorsicht! Bei der Herstellung der Spritzbrühe muss darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Schaum gebildet wird, gegebenenfalls muss die Rührintensität entsprechend reduziert werden. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

**Neudosan Neu (GNS Consult AG)**

s. Info

2%



Bewilligt für: **alle Kulturen**












Schaderreger:

**Blattläuse  
Spinnmilben**

Hinweise:

Pflanze allseitig gut benetzen. Wirkt nur bei direktem Kontakt. Nur bei mehrmaliger Behandlung genügend wirksam. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin (Achtung ÖLN) (IRAC Code 3A)				
<b>Karate Zeon (Syngenta)</b>	1 w	0.1 l/ha		
<b>Kendo (Renovita Wilen GmbH)</b>	1 w	0.1 l/ha		
<b>Kendo (Syngenta)</b>	1 w	0.1 l/ha		
<b>Techno 10 CS (Leu + Gygax)</b>	1 w	0.1 l/ha		
<b>TAK 50 EG (Stähler)</b>	1 w	0.2 kg/ha		
<b>Ravane 50 (Schneider)</b>	1 w	0.2 l/ha		
<b>Techno (Leu + Gygax)</b>	1 w	0.2 l/ha		

Bewilligt für: **Kresse**

Schaderreger:

**Blattläuse**  
**Erdföhe**  
**Erdräupen**  
**Minierfliegen**  
**Thripse**

Hinweise:

Maximal 1 Behandlung pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen des BLW reduziert werden. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

<b>Karate Zeon (Syngenta)</b>	1 w	0.1 l/ha	
<b>Kendo (Renovita Wilen GmbH)</b>	1 w	0.1 l/ha	
<b>Kendo (Syngenta)</b>	1 w	0.1 l/ha	
<b>Techno 10 CS (Leu + Gygax)</b>	1 w	0.1 l/ha	
<b>Ravane 50 (Schneider)</b>	1 w	0.2 l/ha	
<b>Techno (Leu + Gygax)</b>	1 w	0.2 l/ha	

Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae), Cima di rapa**




















Schaderreger:

**Blattläuse**  
**Erdföhe**  
**Erdräupen**  
**Minierfliegen**  
**Thripse**

Hinweise:

Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen des BLW reduziert werden. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Pirimicarb (IRAC Code 1A)					
<b>Pirimicarb (Omya)</b>	1 w	0.5 kg/ha			
<b>Pirimicarb 50 WG (Schneider)</b>	1 w	0.5 kg/ha			
<b>Pirimor (Leu + Gyax)</b>	1 w	0.5 kg/ha			
<b>Pirimor (Stähler)</b>	1 w	0.5 kg/ha			
<b>Pirimor (Syngenta)</b>	1 w	0.5 kg/ha			

Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae), Brunnenkresse, Cima di rapa, Kresse**

Schaderreger:

**Blattläuse**

Hinweise:

Anwendung: spritzen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene unbehandelte Pufferzone von mindestens 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Ausnahmen sind in den Weisungen des BLW festgelegt. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

Wirkstoff: Pyrethrine (IRAC Code 3A)					
<b>BIOHOP DeITRIN (Renovita Wilen GmbH)</b>	3 d	1.5 l/ha			

Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae), Brunnenkresse, Cima di rapa, Kresse**

Schaderreger:

**Blattläuse**

**Spinnmilben**

**Thripse**

**Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)**

**Weisslinge**

Hinweise:

Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle um 2 Punkte reduziert werden. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Pyrethrine + Sesamöl raffiniert (IRAC Code 3A)



### Piretro Verde (Leu + Gygax)

3 d

1.5 l/ha



Bewilligt für: Asia-Salate (Brassicaceae), Brunnenkresse, Cima di rapa, Kresse

Schaderreger:

Hinweise:

**Blattläuse**

Anwendung: Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. Gefährlich für Bienen - Darf nur ausserhalb des Bienenfluges am Abend mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommen. Anwendung im geschlossenen Gewächshaus sofern keine Bestäuber zugegen sind. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen des BLW reduziert werden. Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen des BLW um 2 Punkte reduziert werden.

### Parexan N (Omya)

3 d

0.6 l/ha



### Piretro MAAG (Syngenta)

3 d

0.6 l/ha



Bewilligt für: Asia-Salate (Brassicaceae), Brunnenkresse, Cima di rapa, Kresse

Schaderreger:

Hinweise:

**Blattläuse**

**Spinnmilben**

**Thripse**

**Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)**

**Weisslinge**

Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle um 2 Punkte reduziert werden. Produkt nicht bei Temperaturen unter 10°C lagern.

### Pyrethrum FS (Andermatt Biocontrol)

3 d

0.4 l/ha



Bewilligt für: Asia-Salate (Brassicaceae), Brunnenkresse, Cima di rapa, Kresse

Schaderreger:

Hinweise:

**Blattläuse**


**Spinnmilben**

**Thripse**

**Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)**

Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Im Spritztank bei laufendem Rührwerk anwenden. Bei Spritzgeräten ohne Rührwerk Brühe regelmässig schütteln/rühren. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend, ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle um 2 Punkte reduziert werden. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

Wirkstoff: Quassiaextrakt (IRAC Code UNE)



### Quassan (Andermatt Biocontrol)

3 d

0.2%



Bewilligt für: alle Kulturen

Schaderreger:











Hinweise:

**Blattläuse**

Pflanzen allseitig gut benetzen. Behandlung nach Bedarf wiederholen.





## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Spinosad (IRAC Code 5)			 
<b>Audienz (Omya)</b>	3 d	0.2 l/ha	  <b>BIO</b>
<b>BIOHOP AudiENZ (Renovita Wilen GmbH)</b>	3 d	0.2 l/ha	  <b>BIO</b>
<b>Elvis (Stähler)</b>	3 d	0.2 l/ha	  <b>BIO</b>

Bewilligt für: **Kresse**  
Schaderreger:  
**Blattfressende Raupen (alle)**  
**Eulendraupen (blattfressend)**  
**Minierfliegen**  
**Thripse**

Hinweise:

Anwendung: Behandlungen im Abstand von 7 Tagen. Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Gefährlich für Bienen - Darf nur ausserhalb des Bienenfluges am Abend mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommen. Anwendung im geschlossenen Gewächshaus sofern keine Bestäuber zugegen sind. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). Anwenderschutz-Auflagen beachten!

<b>Audienz (Omya)</b>	3 d	0.2 l/ha	  <b>BIO</b>
<b>BIOHOP AudiENZ (Renovita Wilen GmbH)</b>	3 d	0.2 l/ha	  <b>BIO</b>
<b>Elvis (Stähler)</b>	3 d	0.2 l/ha	  <b>BIO</b>

Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae)**  
Schaderreger:

**Blattfressende Raupen (alle)**  
**Erdräupen**  
**Eulendraupen (blattfressend)**  
**Minierfliegen**  
**Thripse**

Hinweise:

Maximal 2 Behandlungen pro Schnitt und maximal 3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 7 Tagen. Gefährlich für Bienen: Darf nur am Abend ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z. B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen oder nur im geschlossenen Gewächshaus eingesetzt werden, sofern keine Bestäuber zugegen sind. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Wirkstoff: Spirotetramat (IRAC Code 23)			
<b>Movento SC (Bayer)</b>	2 w	0.45 l/ha	

Bewilligt für: **Cima di rapa, Kresse**  
Schaderreger:  
**Blattläuse**

Hinweise:

Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Intervall: 7 bis 14 Tage. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Wirkstoff: Steinernema carpocapsae (Lebende Organismen)			 
<b>BIOHOP NemaSCHNAK (Renovita Wilen GmbH)</b>	3 w	0.5-1 Mio/m <sup>2</sup>	  <b>BIO</b>
<b>Carponem (Andermatt Biocontrol)</b>	3 w	0.5-1 Mio/m <sup>2</sup>	  <b>BIO</b>

Bewilligt für: **alle Kulturen**  
Schaderreger:  
**Erdräupen**  
**Maulwurfsgriellen**

Hinweise:

<b>Nemastar (fenaco UFA-Samen Nützlinge)</b>	s. Info	0.5 Mio/m <sup>2</sup>	  <b>BIO</b>
--	---------	------------------------	--

Bewilligt für: **alle Kulturen**  
Schaderreger:  
**Erdräupen**

Hinweise:

Anwendung bei Bodentemperaturen von mindestens 10°C. Boden nach Anwendung einige Tage gut feucht halten. Nicht bei Sonnenlicht behandeln (abends oder bei Bewölkung). Nur gegen Larvenstadien. Beim Auftreten der ersten Larven im Boden. Nematodenbehandlung vor Pflanzung.

<b>Nemastar (fenaco UFA-Samen Nützlinge)</b>	s. Info	0.5 - 1 Mio/m <sup>2</sup>	  <b>BIO</b>
--	---------	----------------------------	--

Bewilligt für: **alle Kulturen**  
Schaderreger:  
**Maulwurfsgriellen**

Hinweise:

Anwendung in der Vegetationsperiode bei Bodentemperaturen von mindestens 10°C. Boden nach Anwendung einige Tage gut feucht halten. Nicht bei Sonnenlicht behandeln (abends oder bei Bewölkung). Nur gegen Larvenstadien. Beim Auftreten der ersten Larven im Boden. Nematodenbehandlung vor Pflanzung.



## - Insektizide und Akarizide -

Wirkstoff: Xenorhabdus bovienii + Steinernema feltiae (Lebende Organismen) 🕒 🏠

**Traunem (Andermatt Biocontrol)** s. Info 500000 Org/m<sup>2</sup> 🏠 **BIO**

Bewilligt für: alle Kulturen  
Schaderreger:  
**Trauermücken**

Hinweise:  
 Nur gegen Larvenstadien. Anwendung bei Bodentemperaturen von mindestens 10°C. Boden nach Anwendung einige Tage gut feucht halten. Nicht bei Sonnenlicht behandeln (abends oder bei Bewölkung.)

**Nemaplus (fenaco UFA-Samen Nützlinge)** s. Info 500000 Org/m<sup>2</sup> 🏠 **BIO**

Bewilligt für: alle Kulturen  
Schaderreger:  
**Trauermücken**

Hinweise:  
 Nur zur Anzucht von Jungpflanzen. Nur gegen Larvenstadien. Anwendung bei Bodentemperaturen von mindestens 10°C. Boden nach Anwendung einige Tage gut feucht halten. Nicht bei Sonnenlicht behandeln (abends oder bei Bewölkung.)

## - Fungizide -

Wirkstoff: Azoxystrobin (FRAC Nr. 11/Code C3) 🕒 🏠 🔊

**Legado (Sintagro)** 1 w 1 l/ha 🏠

Bewilligt für: Asia-Salate (Brassicaceae)  
Schaderreger:  
**Blattfleckenpilze**

Hinweise:  
 Anwendung: Ab Stadium BBCH 13. Maximal 1 Behandlung pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S 2 und Sh) ausbringen. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

<b>Amistar (Omya)</b>	1 w	1 l/ha	🏠
<b>Amistar (Stähler)</b>	1 w	1 l/ha	🏠
<b>Amistar (Syngenta)</b>	1 w	1 l/ha	🏠
<b>Heritage Flow (Syngenta)</b>	1 w	1 l/ha	🏠
<b>Ortiva (Renovita Wilen GmbH)</b>	1 w	1 l/ha	🏠
<b>Ortiva (Syngenta)</b>	1 w	1 l/ha	🏠

Bewilligt für: Asia-Salate (Brassicaceae)  
Schaderreger:  
**Blattfleckenpilze**

Hinweise:  
 Anwendung: Ab Stadium BBCH 13. Maximal 1 Behandlung pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S2 und Sh) ausbringen. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Wirkstoff: Coniothyrium minitans (FRAC Nr. BM02/Code BM) 🕒 🏠

**Contans WG (Andermatt Biocontrol) 30.06.2024** ⚠️ s. Info 2 - 8 kg/ha 🏠 **BIO**

**Contans WG (Bayer) 05.04.2024** ⚠️ s. Info 2 - 8 kg/ha 🏠 **BIO**

Bewilligt für: alle Kulturen  
Schaderreger:  
**Sclerotinia-Fäule**

Hinweise:  
 Anwendung: Bodenbehandlung mindestens 2-3 Monate vor Anbau der Kultur. Aufwandmenge je nach Einarbeitungstiefe. Nach Anwendung sofort in den Boden einarbeiten

**Contans WG (Andermatt Biocontrol) 30.06.2024** ⚠️ s. Info 2 - 8 kg/ha 🏠 **BIO**

**Contans WG (Bayer) 05.04.2024** ⚠️ s. Info 2 - 8 kg/ha 🏠 **BIO**

Bewilligt für: alle Kulturen  
Schaderreger:  
**Sclerotinia-Fäule**

Hinweise:  
 Anwendung: Stadium 00-14 (BBCH) oder Nacherntebehandlung. Maximal 4 Behandlungen im Abstand von 8 Tagen.

Wirkstoff: Fenhexamid (FRAC Nr. 17/Code G3) 🕒 🏠 🔊

**Teldor (Bayer)** 3 d 1.5 kg/ha 🏠

Bewilligt für: Cima di rapa, Kresse  
Schaderreger:  
**Graufäule (Botrytis)**

Hinweise:  
 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

## - Fungizide -

Wirkstoff: Fluopyram (FRAC Nr. 7/Code C2)

**Moon Privilege (Bayer)**



3 w



0.5 l/ha



Bewilligt für: Cima di rapa, Kresse

Schaderreger:

**Graufäule (Botrytis)**  
**Sclerotinia-Fäule**

Hinweise:

Anwendung: Stadium 20-43 (BBCH). Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Wirkstoff: Mandipropamid (FRAC Nr. 40/Code H5)

**Revus (Syngenta)**



1 w



0.6 l/ha



Bewilligt für: Asia-Salate (Brassicaceae)

Schaderreger:

**Falscher Mehltau (Peronospora)**

Hinweise:

Anwendung: ab Befallsbeginn. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

**Revus (Syngenta)**



2 w



0.6 l/ha



Bewilligt für: Cima di rapa

Schaderreger:

**Falscher Mehltau (Peronospora)**

Hinweise:

Anwendung: Freiland, Stadium 16-49 (BBCH). Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 10 Tagen.

Wirkstoff: Tebuconazole + Trifloxystrobin (FRAC Nr. 3/Code G1 + 11/Code C3)

**Nativo (Bayer)**



3 w



0.4 kg/ha



Bewilligt für: Cima di rapa

Schaderreger:

**Alternaria-Kohlschwärze**

Hinweise:

Erste Behandlung bei Befallsbeginn. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das den Wirkstoff Tebuconazole enthält. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

Wirkstoff: Trifloxystrobin + Fluopyram (FRAC Nr. 11/Code C3 + Nr. 7/Code C2)

**Moon Sensation (Bayer)**



2 w



0.8 l/ha



Bewilligt für: Cima di rapa, Kresse

Schaderreger:

**Graufäule (Botrytis)**  
**Sclerotinia-Fäule**

Hinweise:

Anwendung: Freiland, Stadium 40-49 (BBCH). Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

**Moon Sensation (Bayer)**



3 w



0.8 l/ha



Bewilligt für: Cima di rapa, Kresse

Schaderreger:

**Graufäule (Botrytis)**  
**Sclerotinia-Fäule**

Hinweise:

Anwendung: Gewächshaus, Stadium 20-45 (BBCH). Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

## - Nematizide -

## - Nematizide -

Wirkstoff: Dazomet (IRAC Code 8F)



### Basamid-Granulat (Syngenta)

s. Info

40 - 50 g/m<sup>2</sup>



Bewilligt für: **alle Kulturen**

Schaderreger:

**Bodenbürtige / Auflauf- Krankheiten (Pythium, Phytophthora)  
Samenbürtige Pilze**

Hinweise:

Flächenbehandlung: Saatbeet und Anzucht von Jungpflanzen. Tiefere Dosierung auf sandigen, schwach humosen Böden; höhere Dosierung auf schweren, schwach humosen Böden. Bei allen Anwendungen soll eine Einarbeitungstiefe von 20 cm eingehalten werden. Karenzfrist zwischen Behandlung und Pflanzung bzw. Behandlung und Aussaat sowie Vorsichtsmassnahmen gemäss den Angaben der Bewilligungsinhaberin beachten. Behandelte Flächen im Freiland nach der Behandlung bis zur ersten Bodenbearbeitung mit einer Plastikfolie abdecken. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene unbehandelte Pufferzone von mindestens 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Ausnahmen sind in den Weisungen des BLW festgelegt. Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S2 und Sh) ausbringen. Zum Schutz von Bodenorganismen dieses Pflanzenschutzmittel oder andere Pflanzenschutzmittel, die den Wirkstoff Dazomet (DMTT) enthalten, nicht mehr als einmal alle 3 Jahre auf derselben Parzelle anwenden. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

### Basamid-Granulat (Syngenta)

s. Info

200 g/m<sup>3</sup>



Bewilligt für: **alle Kulturen**

Schaderreger:

**Bodenbürtige / Auflauf- Krankheiten (Pythium, Phytophthora)  
Samenbürtige Pilze**

Hinweise:

Substratbehandlung: Saatbeet und Anzucht von Jungpflanzen. Keine Kompostbehandlung. Karenzfrist zwischen Behandlung und Pflanzung bzw. Behandlung und Aussaat sowie Vorsichtsmassnahmen gemäss den Angaben der Bewilligungsinhaberin beachten. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene unbehandelte Pufferzone von mindestens 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Ausnahmen sind in den Weisungen des BLW festgelegt. Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S2 und Sh) ausbringen. Zum Schutz von Bodenorganismen dieses Pflanzenschutzmittel oder andere Pflanzenschutzmittel, die den Wirkstoff Dazomet (DMTT) enthalten, nicht mehr als einmal alle 3 Jahre auf derselben Parzelle anwenden. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

## - Herbizide -

Wirkstoff: Metazachlor (Achtung ÖLN) (HRAC Code K3)



### Bredola (Omya)

s. Info

0.8 l/ha



Bewilligt für: **Cima di rapa**

Schaderreger:

**Ungräser auflaufend  
Unkräuter auflaufend**

Hinweise:

Anwendung: Vorauflauf, unmittelbar nach der Saat. Phytotoxschäden bei empfindlichen Arten oder Sorten möglich. Keine Wirksamkeit gegen Klettenlabkraut und Ausfallgetreide. Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen des BLW um 1 Punkt reduziert werden. Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 1 kg des Wirkstoffs Metazachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden. Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S 2) ausbringen. Anwenderschutz-Auflagen beachten! Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Wirkstoff: Napropamide (HRAC Code K3)



### Aprex FL (Stähler)

s. Info

0.85 l/ha



### Devrinol FL (Stähler)

s. Info

0.85 l/ha



### Nikkel (Omya)

s. Info

0.85 l/ha



Bewilligt für: **Asia-Salate (Brassicaceae)**

Schaderreger:

**Ungräser auflaufend  
Unkräuter auflaufend**

Hinweise:

Anwendung: Vorauflauf, unmittelbar nach der Saat. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

## LEGENDE

Wartefrist

Dosierung



Bienengiftig



Fischgiftig



Gewächshaus / gedeckte Kulturen



alle Anbauformen



Freiland



n.d. nicht definiert



Diese Produkte sind für den Biolandbau zugelassen (ohne Gewähr). Die aktuell für Bio Suisse zugelassenen Produkte sind der Hilfsstoffliste des FiBL zu entnehmen.



Zurückgezogene Bewilligung. Aufbrauchfrist läuft bis zum angegebenen Datum.

## IMPRESSUM

Herausgeber: Agroscope, Schloß 1, Postfach, CH-8820 Wädenswil, [www.agroscope.ch](http://www.agroscope.ch)

Redaktion: Brigitte Baur

Quelle: <http://dataphyto.acw-online.ch>

Copyright: Agroscope

Stand der Datenbasis: 16.07.2023

Weiterverwendung von Teilen dieses Dokuments nur mit schriftlicher Einwilligung von Agroscope und mit vollständiger Quellenangabe gestattet.